

Gebrauchsinformation

Antibiophilus - Beutel

Wirkstoff:

Lyophilisat von Lactobacillus c.r.

Z.Nr.: 1-23449

Was sind Antibiophilus Beutel?

Zusammensetzung

1 Beutel zu 1,5 g enthält lebensfähige Keime von Milchsäurebakterien (Lactobacillus casei, var. rhamnosus) mit einer Keimzahl von mindestens 1000 Millionen pro Gramm.

weitere Bestandteile:

Kartoffelstärke, Lactose, Maltodextrine

Arzneiform:

Pulver

Packungsgrößen:

10 und 100 Stück

Wie wirkt Antibiophilus?

Die im menschlichen Darm natürlich lebenden Bakterien (Darmflora) sind für das normale Funktionieren der Darmtätigkeit und Verdauung von größter Wichtigkeit. Diese Darmflora besteht aus verschiedenen Arten von Bakterien, die miteinander in einem ausgewogenen Gleichgewicht leben. Durch ungewohnte oder falsche Ernährung, Infektionen, Behandlung mit Antibiotika oder Strahlenbehandlung kann es zu einer Störung dieses Gleichgewichts und in der Folge zu Durchfällen oder auch Verstopfung kommen.

Eine sehr wichtige Art dieser im menschlichen Darm natürlich vorkommenden Keime sind Milchsäurebakterien (Lactobacillen). Antibiophilus enthält eine große Zahl lebensfähiger Milchsäurebakterien. Durch die Einnahme von Antibiophilus kann so eine geschädigte oder zerstörte Darmflora wieder in ihr natürliches Gleichgewicht gebracht werden.

Zulassungsinhaber

Germania Pharmazeutika, 1150 Wien

Hersteller

Laboratoires Lyocentre, 15004 Aurillac, Frankreich

Wogegen hilft Antibiophilus?

(Anwendungsgebiete)

Durchfälle verschiedener Ursachen, vor allem auch Durchfälle nach Behandlung mit Antibiotika oder nach Strahlenbehandlung

Wann sollen Sie Antibiophilus nicht einnehmen?
(Gegenanzeigen)

Überempfindlichkeit gegen einen der Bestandteile.

Schwangerschaft und Stillperiode

Antibiophilus kann auch während der Schwangerschaft und Stillzeit gegeben werden

Worauf sollten Sie besonders achten?
(Vorsichtsmaßnahmen und besondere Warnhinweise)

Da der Körper bei Durchfällen Wasser und Salze verliert, sollen Sie in jedem Fall auf eine ausreichende Zufuhr von Flüssigkeit und Mineralstoffen achten.

Antibiophilus Beutel enthalten 0,38 g Laktose (Milchzucker) pro Beutel. Diese Menge ist wahrscheinlich zu gering, um bei Laktoseunverträglichkeit eine Reaktion zu verursachen.

Wenn sich Ihre Beschwerden durch Antibiophilus nicht bessern, vor allem, wenn die Durchfälle auch nach einigen Tagen nicht aufhören, sprechen Sie bitte möglichst rasch mit Ihrem Arzt.

Wie alle Arzneimittel sollten auch Antibiophilus Beutel für Kinder unerreicht aufbewahrt werden.

Dürfen Sie Antibiophilus gleichzeitig mit anderen Medikamenten einnehmen?
(Wechselwirkungen)

Von Antibiophilus sind keine Wechselwirkungen mit anderen Medikamenten bekannt

Wie oft und wie lange sollen Sie Antibiophilus einnehmen?
(Dosierung)

Erwachsene: 1 - 2 x täglich 1 Beutel
Kinder: 1 x täglich 1 Beutel

Bei Säuglingen und Kleinkindern kann der Inhalt des Beutels über den Tag verteilt gegeben werden.

Bei schweren oder hartnäckigen Fällen können Sie auch mehr als 2 Antibiophilus Beutel pro Tag einnehmen. Eine Einnahme ist auch über längere Zeit möglich.

Wie nehmen Sie Antibiophilus Beutel am besten ein?

Reißen Sie den Beutel auf, rühren Sie den Inhalt in etwas Flüssigkeit und schlucken Sie die Mischung. Sie können das Pulver auch in Joghurt oder ähnliches mischen und so einnehmen.

Es wird empfohlen, Antibiophilus nicht unmittelbar vor oder nach den Mahlzeiten einzunehmen, damit die Keime nur möglichst kurze Zeit im Magen verweilen. Am besten ist es, wenn Sie Antibiophilus mindestens eine halbe Stunde vor oder eine Stunde nach den Mahlzeiten einnehmen.

**Welche unerwünschten Wirkungen kann Antibiophilus eventuell verursachen?
(Nebenwirkungen)**

In sehr seltenen Fällen wurde bei einer Behandlung mit Antibiophilus über Magen-Darm-Beschwerden (z.B. Blähungen) berichtet. Diese Beschwerden können aber auch durch die Krankheit selbst verursacht werden.

Wenn Sie glauben, daß andere Beschwerden von diesem Arzneimittel verursacht werden, sagen Sie es bitte Ihrem Arzt oder Apotheker.

Verfalldatum und Lagerung

Bitte beachten Sie das Verfalldatum und verwenden Sie Antibiophilus nicht länger als angegeben.

Geöffnete Beutel rasch verbrauchen und nicht lagern.

Nicht über 25°C lagern

Stand der Gebrauchsinformation: März 2012

Wenn Ihnen die Anwendung oder Dosierung nicht klar ist, oder wenn Sie noch andere Fragen haben, wenden Sie sich bitte an Ihren Arzt oder Apotheker.