

GEBRAUCHSINFORMATION: INFORMATION FÜR ANWENDER

dexalgin®Dequadex Halspastillen

Wirkstoffe: Dequaliniumchlorid und Dexpanthenol

Lesen Sie die gesamte Packungsbeilage sorgfältig durch, bevor Sie mit der Einnahme dieses Arzneimittels beginnen, denn sie enthält wichtige Informationen.

Nehmen Sie dieses Arzneimittel immer genau wie in dieser Packungsbeilage beschrieben bzw. genau nach Anweisung Ihres Arztes oder Apothekers ein.

- Heben Sie die Packungsbeilage auf. Vielleicht möchten Sie diese später nochmals lesen.
- Fragen Sie Ihren Apotheker, wenn Sie weitere Informationen oder einen Rat benötigen.
- Wenn Sie Nebenwirkungen bemerken, wenden Sie sich an Ihren Arzt oder Apotheker. Dies gilt auch für Nebenwirkungen, die nicht in dieser Packungsbeilage angegeben sind. Siehe Abschnitt 4.
- Wenn Sie sich nach 5 Tagen nicht besser oder gar schlechter fühlen, wenden Sie sich an Ihren Arzt.

Was in dieser Packungsbeilage steht:

1. Was sind dexalgin Dequadex Halspastillen und wofür werden sie angewendet?
2. Was sollten Sie vor der Einnahme von dexalgin Dequadex Halspastillen beachten?
3. Wie sind dexalgin Dequadex Halspastillen einzunehmen?
4. Welche Nebenwirkungen sind möglich?
5. Wie sind dexalgin Dequadex Halspastillen aufzubewahren?
6. Inhalt der Packung und weitere Informationen

1. WAS SIND dexalgin Dequadex Halspastillen UND WOFÜR WERDEN SIE ANGEWENDET?

dexalgin Dequadex Halspastillen beinhalten ein keimtötendes Mittel (Dequaliniumchlorid) sowie Dexpanthenol (=Provitamin B5), das die Wundheilung fördert und dadurch die Wirkung von Dequaliniumchlorid unterstützt.

dexalgin Dequadex Halspastillen werden angewendet zur unterstützenden Behandlung von Entzündungen im Mund- und Rachenraum (Halsschmerzen, Heiserkeit, Entzündungen der Mundschleimhaut).

Wenn Sie sich nach 5 Tagen nicht besser oder gar schlechter fühlen, wenden Sie sich an Ihren Arzt.

2. WAS SOLLTEN SIE VOR DER EINNAHME VON dexalgin Dequadex Halspastillen BEACHTEN?

dexalgin Dequadex Halspastillen dürfen nicht eingenommen werden,

- wenn Sie allergisch gegen Dequaliniumchlorid, Dexpanthenol oder einen der in Abschnitt 6. genannten sonstigen Bestandteile dieses Arzneimittels sind.
- wenn Sie unter Bronchialasthma oder anderen Atemwegserkrankungen, die mit einer ausgeprägten Überempfindlichkeit der Atemwege einhergehen leiden. Die Inhalation von dexalgin Dequadex Halspastillen kann zu Atemnot führen oder einen Asthmaanfall auslösen.

Warnhinweise und Vorsichtsmaßnahmen

Bitte sprechen Sie mit Ihrem Arzt oder Apotheker, bevor Sie dexalgin Dequadex Halspastillen einnehmen.

Wenn die Beschwerden andauern oder die Behandlung nicht den erwarteten Erfolg zeigt, ist ehestens eine ärztliche Beratung erforderlich.

Bei schweren bzw. eitrigen Halsentzündungen oder Halsschmerzen, die mit hohem Fieber, Kopfschmerzen, Übelkeit oder Erbrechen einhergehen, ist ein Arzt zu konsultieren. Bei Schleimhautschäden sollten dexalgin Dequadex Halspastillen wegen möglicher Wundheilungsstörungen nicht angewendet werden.

Kinder

Wegen der Gefahr von unabsichtlichem Verschlucken der ganzen Pastille sowie wegen des Gehalts an Menthol dürfen dexalgin Dequadex Halspastillen nicht bei Kindern unter 4 Jahren angewendet werden.

Einnahme von dexalgin Dequadex Halspastillen zusammen mit anderen Arzneimitteln

Informieren Sie Ihren Arzt oder Apotheker, wenn Sie andere Arzneimittel einnehmen/anwenden, kürzlich andere Arzneimittel eingenommen/angewendet haben oder beabsichtigen andere Arzneimittel einzunehmen/anzuwenden.

Es sind keine Wechselwirkungen mit anderen Arzneimitteln bekannt.

Einnahme von dexalgin Dequadex Halspastillen zusammen mit Nahrungsmitteln und Getränken

Sie sollten unmittelbar vor und nach dem Lutschen der dexalgin Dequadex Halspastillen nichts essen oder trinken.

Schwangerschaft und Stillzeit

Wenn Sie schwanger sind oder stillen, oder wenn Sie vermuten, schwanger zu sein oder beabsichtigen schwanger zu werden, fragen Sie vor der Einnahme dieses Arzneimittels Ihren Arzt oder Apotheker um Rat.

Da keine ausreichenden Daten vorliegen, wird die Anwendung während der Schwangerschaft und in der Stillzeit nicht empfohlen.

Verkehrstüchtigkeit und Fähigkeit zum Bedienen von Maschinen

Es wurden keine Untersuchungen zu den Auswirkungen auf die Verkehrstüchtigkeit und die Fähigkeit zum Bedienen von Maschinen durchgeführt.

dexalgin Dequadex Halspastillen enthalten Maltitol und Sorbitol als Lösung

Zuckerunverträglichkeit: dexalgin Dequadex Halspastillen enthalten Maltitol und Sorbitol (Zuckeraustauschstoffe) jeweils als Lösung. Bitte nehmen Sie dexalgin Dequadex Halspastillen daher erst nach Rücksprache mit Ihrem Arzt ein, wenn Ihnen bekannt ist, dass Sie unter einer Zuckerunverträglichkeit leiden.

1 Pastille entspricht ungefähr 0,05 BE.

3. WIE SIND dexalgin Dequadex Halspastillen EINZUNEHMEN?

Nehmen Sie dieses Arzneimittel immer genau wie in dieser Packungsbeilage beschrieben bzw. genau nach der mit Ihrem Arzt oder Apotheker getroffenen Absprache ein. Fragen Sie bei Ihrem Arzt oder Apotheker nach, wenn Sie sich nicht sicher sind.

Dosierung

Die empfohlene Dosis beträgt:

Kinder von 4 bis 12 Jahren, Jugendliche ab 12 Jahren und Erwachsene:

Mehrmals täglich 1 dexalgin Dequadex Halspastille im Mund zergehen lassen.

Bei Bedarf kann alle 2 Stunden 1 Pastille (bis zu 5 Pastillen täglich) gelutscht werden.

Wegen der Gefahr von unabsichtlichem Verschlucken der ganzen Pastille sowie wegen des Gehalts an Menthol dürfen dexalgin Dequadex Halspastillen nicht bei Kindern unter 4 Jahren angewendet werden.

Zum Einnehmen. Zum Lutschen.

Wie und wann sollten Sie dexalgin Dequadex Halspastillen einnehmen

- Um eine optimale Wirkung zu erzielen, sollten Sie unmittelbar vor und nach dem Lutschen von dexalgin Dequadex Halspastillen nichts essen oder trinken.
- Die Einnahme sollte möglichst bei den ersten Anzeichen von Beschwerden beginnen und nach Besserung weitere 2-3 Tage erfolgen.
- Wenn die Symptome nach ca. 5 Tagen nicht abklingen oder verschwinden, soll ärztlicher Rat eingeholt werden.

Bei Fortbestand der Beschwerden oder wenn der erwartete Erfolg durch die Behandlung nicht eintritt, sollten Sie sich von Ihrem Arzt oder Zahnarzt beraten lassen.

Wenn Sie eine größere Mengen von dexalgin Dequadex Halspastillen eingenommen haben, als Sie sollten

Nehmen Sie nicht die doppelte Menge ein, wenn Sie die vorherige Einnahme vergessen haben.

Bei Mengen von über 10 g Maltitol und Sorbitol pro Tag, die mehr als 10 Pastillen entsprechen würden, ist mit einer abführenden Wirkung zu rechnen.

Wenn Sie weitere Fragen zur Anwendung dieses Arzneimittels haben, fragen Sie Ihren Arzt oder Apotheker.

4. WELCHE NEBENWIRKUNGEN SIND MÖGLICH?

Wie alle Arzneimittel können dexalgin Dequadex Halspastillen Nebenwirkungen haben, die aber nicht bei jedem auftreten müssen. Wenn Sie Nebenwirkungen bemerken, wenden Sie sich an Ihren Arzt oder Apotheker. Dies gilt auch für Nebenwirkungen, die nicht in dieser Packungsbeilage angegeben sind.

Überempfindlichkeitsreaktionen (z. B. Juckreiz, Hautausschlag) sowie Geschmackirritationen können nicht ausgeschlossen werden. Die Häufigkeit ist nicht bekannt (Häufigkeit auf Grundlage der verfügbaren Daten nicht abschätzbar).

Meldung von Nebenwirkungen

Wenn Sie Nebenwirkungen bemerken, wenden Sie sich an Ihren Arzt oder Apotheker. Dies gilt auch für Nebenwirkungen, die nicht in dieser Packungsbeilage angegeben sind. Sie können Nebenwirkungen auch direkt über das

Bundesamt für Sicherheit im Gesundheitswesen
Traisengasse 5
1200 WIEN
ÖSTERREICH
Fax: + 43 (0) 50 555 36207
Website: <http://www.basg.gv.at/>

anzeigen. Indem Sie Nebenwirkungen melden, können Sie dazu beitragen, dass mehr Informationen über die Sicherheit dieses Arzneimittels zur Verfügung gestellt werden.

5. WIE SIND dexalgin Dequadex Halspastillen AUFZUBEWAHREN?

Nicht über 25°C lagern.

In der Originalverpackung aufbewahren, um den Inhalt vor Licht zu schützen.

Bewahren Sie dieses Arzneimittel für Kinder unzugänglich auf.

Sie dürfen dieses Arzneimittel nach dem auf dem Umkarton und der Blisterpackung nach „Verwendbar bis: bzw. Verw. bis:“ angegebenen Verfalldatum nicht mehr verwenden. Das Verfalldatum bezieht sich auf den letzten Tag des angegebenen Monats.

Entsorgen Sie Arzneimittel nicht im Abwasser oder Haushaltsabfall. Fragen Sie Ihren Apotheker wie das Arzneimittel zu entsorgen ist, wenn Sie es nicht mehr verwenden. Sie tragen damit zum Schutz der Umwelt bei.

6. INHALT DER PACKUNG UND WEITERE INFORMATIONEN

Was dexalgin Dequadex Halspastillen enthalten

Die Wirkstoffe sind: Dequaliniumchlorid und Dexpanthenol.

1 dexalgin Dequadex Halspastille enthält 0,45 mg Dequaliniumchlorid und 50 mg Dexpanthenol.

Die sonstigen Bestandteile sind:

Gummi arabicum (E 414), Maltitollösung (E 965), 70% Sorbitollösung (E 420), Natriumchlorid, Menthol, Anisöl, Acesulfam Kalium (E 950), Paraffin flüssig, gebleichtes Wachs (E 901), gereinigtes Wasser, Farbstoff Erythrosin (E127).

Wie dexalgin Dequadex Halspastillen aussehen und Inhalt der Packung

dexalgin Dequadex Halspastillen sind runde, rote Lutschpastillen und in Packungen zu 20 Stück erhältlich.

Pharmazeutischer Unternehmer und Hersteller
Kwizda Pharma GmbH, 1160 Wien

Z.Nr.: 1-31450

Diese Packungsbeilage wurde zuletzt überarbeitet im Mai 2014.