

GEBRAUCHSINFORMATION: INFORMATION FÜR DEN ANWENDER

LYMPHDIARAL® Drainagesalbe

Lesen Sie die gesamte Packungsbeilage sorgfältig durch, bevor Sie mit der Anwendung dieses Arzneimittels beginnen, denn sie enthält wichtige Informationen.

Wenden Sie dieses Arzneimittel immer genau wie in dieser Packungsbeilage beschrieben bzw. genau nach Anweisung Ihres Arztes oder Apothekers an.

- Heben Sie die Packungsbeilage auf. Vielleicht möchten Sie diese später nochmals lesen.
- Fragen Sie Ihren Apotheker, wenn Sie weitere Informationen oder einen Rat benötigen.
- Wenn Sie Nebenwirkungen bemerken, wenden Sie sich an Ihren Arzt oder Apotheker oder das medizinische Fachpersonal. Dies gilt auch für Nebenwirkungen, die nicht in dieser Packungsbeilage angegeben sind. Siehe Abschnitt 4.
- Wenn Sie sich nach 7 Tagen nicht besser oder gar schlechter fühlen, wenden Sie sich an Ihren Arzt.

Was in dieser Packungsbeilage steht

1. Was ist LYMPHDIARAL® Drainagesalbe und wofür wird sie angewendet?
2. Was müssen Sie vor der Anwendung von LYMPHDIARAL® Drainagesalbe beachten?
3. Wie ist LYMPHDIARAL® Drainagesalbe anzuwenden?
4. Welche Nebenwirkungen sind möglich?
5. Wie ist LYMPHDIARAL® Drainagesalbe aufzubewahren?
6. Inhalt der Packung und weitere Informationen

1. WAS IST LYMPHDIARAL® DRAINAGESALBE UND WOFÜR WIRD SIE ANGEWENDET?

LYMPHDIARAL® Drainagesalbe ist eine homöopathische Arzneispezialität.

Die Homöopathie versteht sich als Regulationstherapie bei akuten und chronischen Krankheiten.

LYMPHDIARAL® Drainagesalbe ist ein homöopathisches Komplexmittel, das sich aus folgenden Einzelmitteln zusammensetzt:

Conium, Calendula, Hydrargyrum bijodatum (Mercurius bijodatus), Stibium sulfuratum nigrum.

Anwendungsgebiete:

Die Anwendungsgebiete leiten sich von den homöopathischen Arzneimittelbildern ab:

- Zur lokalen Anwendung bei Schwellungen und Entzündungen der Lymphknoten und bei Störungen des Lymphabflusses.

Die Anwendung dieses homöopathischen Arzneimittels in den genannten Anwendungsgebieten beruht ausschließlich auf homöopathischer Erfahrung. Bei schweren Formen dieser Erkrankungen ist eine klinisch belegte Therapie angezeigt.

2. WAS SOLLTEN SIE VOR DER ANWENDUNG VON LYMPHDIARAL® DRAINAGESALBE BEACHTEN?

LYMPHDIARAL® Drainagesalbe darf nicht angewendet werden,

- wenn Sie überempfindlich (allergisch) gegen einen der Wirkstoffe, insbesondere Pflanzen aus der Familie der Korbblütler oder einen der in Abschnitt 6. genannten sonstigen Bestandteile dieses Arzneimittels sind.
- Zur Anwendung dieses Arzneimittels an Säuglingen liegen keine ausreichend dokumentierten Erfahrungen vor. Es soll deshalb bei Kindern unter einem Jahr nicht angewendet werden.

Warnhinweise und Vorsichtsmaßnahmen

Bitte sprechen Sie mit Ihrem Apotheker, bevor Sie LYMPHDIARAL® Drainagesalbe anwenden.

- Bei Anwendung homöopathischer Arzneimittel können sich die vorhandenen Beschwerden vorübergehend verschlimmern (Erstreaktion). Das Arzneimittel ist dann abzusetzen. Nach Abklingen der Erstreaktion kann das Arzneimittel wieder angewendet werden. Bei neuerlicher Verstärkung der Beschwerden ist das Mittel abzusetzen.
- Homöopathische Arzneimittel können bei dafür empfänglichen Personen neue Beschwerden (Arzneimittelprüfungssymptome) hervorrufen. Beim Auftreten neuer Beschwerden soll das Arzneimittel abgesetzt werden.

Kinder

zur Anwendung dieses Arzneimittels an Säuglingen liegen keine ausreichend dokumentierten Erfahrungen vor. Es soll deshalb bei Kindern unter einem Jahr nicht angewendet werden.

Anwendung von LYMPHDIARAL® Drainagesalbe mit anderen Arzneimitteln

Wechselwirkungen mit anderen Arzneimitteln sind bisher nicht bekannt.

Informieren Sie Ihren Arzt oder Apotheker, wenn Sie andere Arzneimittel anwenden bzw. kürzlich andere Arzneimittel eingenommen oder angewendet haben oder beabsichtigen andere Arzneimittel einzunehmen oder anzuwenden.

Anwendung von LYMPHDIARAL® Drainagesalbe zusammen mit Nahrungsmitteln, Getränken und Alkohol

Allgemeiner Hinweis: Die Wirkung eines homöopathischen Arzneimittels kann durch allgemein schädigende Faktoren in der Lebensweise und durch Reiz- und Genussmittel (z.B. Nikotin, Alkohol, Kaffee) ungünstig beeinflusst werden.

Schwangerschaft und Stillzeit

Wenn Sie schwanger sind oder stillen, oder wenn Sie vermuten, schwanger zu sein oder beabsichtigen, schwanger zu werden, fragen Sie vor der Einnahme / Anwendung von allen Arzneimitteln Ihren Arzt oder Apotheker um Rat.

Daten über die Anwendung in der Schwangerschaft und Stillzeit liegen nicht vor.

Die Anwendung während der Schwangerschaft und Stillzeit wird nicht empfohlen.

Verkehrstüchtigkeit und Fähigkeit zum Bedienen von Maschinen

Das Arzneimittel hat keinen oder einen vernachlässigbaren Einfluss auf die Verkehrstüchtigkeit und das Bedienen von Maschinen.

LYMPHDIARAL® Drainagesalbe enthält Cetylstearylalkohol.

Der Salbenhilfsstoff Cetylstearylalkohol kann örtlich begrenzt Hautreizungen (z.B. Kontaktdermatitis) hervorrufen.

3. WIE IST LYMPHDIARAL® DRAINAGESALBE ANZUWENDEN?

Wenden Sie dieses Arzneimittel immer genau wie in dieser Packungsbeilage beschrieben bzw. genau nach der mit Ihrem Arzt oder Apotheker getroffenen Absprache an. Fragen Sie bei Ihrem Arzt oder Apotheker nach, wenn Sie sich nicht sicher sind.

Die empfohlene Dosis beträgt:

Erwachsene, Jugendliche, Kinder 7 – 12 Jahre

1 - 3 x täglich Aufbringen und Einreiben von 2-3 cm Salbenstrang zunächst im Lymphknoten- und Lymphabflussbereich (Hals, Leiste), dann im Bereich der Beschwerden.

(Klein)kinder (1 – 6 Jahre)

1 - 3 x täglich Aufbringen und Einreiben von 1-2 cm Salbenstrang zunächst im Lymphknoten- und Lymphabflussbereich (Hals, Leiste), dann im Bereich der Beschwerden.

Die Anwendung von LYMPHDIARAL® Drainagesalbe bei Kindern unter einem Jahr wird nicht empfohlen, da keine ausreichenden Daten vorliegen.

Art der Anwendung

Zum Auftragen auf die Haut.

Dauer der Anwendung

Eine über 1 Woche hinausgehende Anwendung sollte nur nach Rücksprache mit einem homöopathisch erfahrenden Therapeuten erfolgen.

Wenn Sie eine größere Menge von LYMPHDIARAL® Drainagesalbe angewendet haben als Sie sollten:

Es wurden keine Fälle von Überdosierung berichtet.

Wenn Sie die Anwendung von LYMPHDIARAL® Drainagesalbe vergessen haben:

Wenden Sie nicht die doppelte Dosis an, wenn Sie die vorherige Anwendung vergessen haben.

Wenn Sie die Anwendung von LYMPHDIARAL® Drainagesalbe abbrechen:

Bei einer Unterbrechung der Behandlung gefährden Sie den Behandlungserfolg!

Wenn Sie weitere Fragen zur Anwendung des Arzneimittels haben, fragen Sie Ihren Arzt oder Apotheker.

4. WELCHE NEBENWIRKUNGEN SIND MÖGLICH?

Wie alle Arzneimittel kann LYMPHDIARAL® Drainagesalbe Nebenwirkungen haben, die aber nicht bei jedem auftreten müssen.

In sehr seltenen Fällen (weniger als 1:10000 Patienten) können juckende Hautausschläge auftreten, die nach Absetzen der Salbe abklingen.

Nach Anwendung von Hydrargyrum bijodatum kann erneut Speichelfluss auftreten; das Mittel ist dann abzusetzen.

Der Salbenhilfsstoff Cetylstearylalkohol kann örtlich begrenzt Hautreizungen (z.B. Kontaktdermatitis) hervorrufen.

Meldung von Nebenwirkungen

Wenn Sie Nebenwirkungen bemerken, wenden Sie sich an Ihren Arzt oder Apotheker oder das medizinische Fachpersonal. Dies gilt auch für Nebenwirkungen, die nicht in dieser Packungsbeilage angegeben sind.

Sie können Nebenwirkungen auch direkt über das nationale Meldesystem anzeigen:

Bundesamt für Sicherheit im Gesundheitswesen
Traisengasse 5
1200 WIEN
ÖSTERREICH
Fax: + 43 (0) 50 555 36207
Website: <http://www.basg.gv.at/>

Indem Sie Nebenwirkungen melden, können Sie dazu beitragen, dass mehr Informationen über die Sicherheit dieses Arzneimittels zur Verfügung gestellt werden.

5. WIE IST LYMPHDIARAL® DRAINAGESALBE AUFZUBEWAHREN?

In der Originalverpackung: keine besonderen Lagerbedingungen

Bewahren Sie dieses Arzneimittel für Kinder unzugänglich auf.

Sie dürfen dieses Arzneimittel nach dem auf dem Umkarton und auf der Tube nach „Verw. bis“ angegebenen Verfalldatum nicht mehr verwenden. Das Verfalldatum bezieht sich auf den letzten Tag des angegebenen Monats.

Haltbarkeit nach Anbruch der Tube: 3 Monate bei Lagerung nicht über 25°C.

6. INHALT DER PACKUNG UND WEITERE INFORMATIONEN

Was LYMPHDIARAL® Drainagesalbe enthält:

10 g enthalten:

Die Wirkstoffe sind:

Conium D2 0.4 g,

Calendula Ø 0.2 g,

Hydrargyrum bijodatum (Mercurius bijodatus) D5 0.01 g,

Stibium sulfuratum nigrum D2 0.01 g.

Die sonstigen Bestandteile sind:

gereinigtes Wasser, emulgierender Cetylstearylalkohol (Typ A), Ethanol 86% (G/G), Oleyloleat, Sorbitol, Lactose-Monohydrat.

Wie LYMPHDIARAL® Drainagesalbe aussieht und Inhalt der Packung:

LYMPHDIARAL® Drainagesalbe ist eine homogene, weiße glänzende Salbe, die in einer Aluminiumtube mit Innenschutzlack aus Epoxid-Phenolharz enthalten ist.
Schraubverschluss aus Polyethylen

Packungsgrößen: 40 g, 100 g.

Es werden möglicherweise nicht alle Packungsgrößen in den Verkehr gebracht.

Pharmazeutischer Unternehmer und Hersteller:

Zulassungsinhaber und Hersteller:

PASCOE pharmazeutische Präparate GmbH.

Schiffenberger Weg 55

D-35394 Giessen

Deutschland

Telefon +49-641-7960-0

Telefax +49-641-7960-109

E-Mail: info@pascoe.de

Z.Nr.: 3-00346

Diese Packungsbeilage wurde zuletzt überarbeitet im November 2013