

Utipro[®] plus

Anwendungsbereich

Utipro[®] plus wird angewendet zur Kontrolle und Vorbeugung von Harnwegsinfekten, die durch Krankheitserreger wie E. coli und andere für gewöhnlich an der Entstehung von urologischen Infektionen beteiligte gramnegative Bakterien verursacht wurden.

Das Medizinprodukt aus Xyloglucan (Hemicellulose) und Gelatine wirkt mechanisch im Inneren des Darmes, indem der Kontakt der Krankheitserreger mit der Darmschleimhaut unterbunden wird. Dies ist der erste Schritt zu ihrer Verbreitung und ihrem anschließenden Eindringen in die Harnwege.

Utipro[®] plus wird ab dem Auftreten der ersten Symptome von Harnwegserkrankungen oral eingenommen, mit dem Ziel, die Vermehrung der Krankheitserreger zu vermindern, die zu Infektionen führen könnten. Bei wiederkehrenden Infektionen wird Utipro[®] plus auch zur Vorbeugung von Rückfällen angewendet, bei denen die Vermehrung von Krankheitserregern zu wiederholten Harnwegsinfekten führt.

Packung

Blisterpackung mit 15 oder 30 Kapseln.

Zusammensetzung

Xyloglucan, Gelatine (porcinen Ursprungs), Propolis, Hibiscus sabdariffa, Siliciumdioxid, Magnesiumstearat (pflanzlichen Ursprungs) und Maisstärke.

Anwendungshinweis

Die Kapsel mit Flüssigkeit schlucken.

Dosierung

Bei Auftreten der ersten Symptome von Harnwegsbeschwerden nehmen die Patienten täglich 2 Kapseln Utipro[®] plus über 5 Tage ein (1 Kapsel alle 12 Stunden).

Zur Vorbeugung von wiederkehrenden Infekten wird täglich 1 Kapsel über mindestens 15 aufeinanderfolgende Tage pro Monat eingenommen. Gegebenenfalls kann die Behandlung wiederholt werden.

Warnhinweise

- » Die Diagnose eines Harnwegsinfekts muss durch einen Arzt erfolgen.
- » Ein akuter Harnwegsinfekt kann eine antibiotische Behandlung erforderlich machen. Dieses Medizinprodukt hat keine bakterizide oder bakterienhemmende Wirkung und kann daher keine antibiotische Behandlung ersetzen. Utipro[®] plus kann jedoch gleichzeitig dazu verabreicht werden.
- » Obwohl keine Nebenwirkungen bekannt sind, sollte dieses Medizinprodukt nicht in der Schwangerschaft oder während der Stillzeit angewendet werden, außer wenn es durch medizinisches Fachpersonal verordnet wird.
- » Medizinprodukt nach dem auf der Packung aufgedruckten Verfalldatum nicht mehr verwenden.
- » Medizinprodukt nicht einnehmen, wenn die Blisterpackung geöffnet oder beschädigt ist.
- » Bei Raumtemperatur an einem trockenen Ort abseits von Wärmequellen lagern. Nicht einfrieren.
- » Medizinprodukt für Kinder unzugänglich aufbewahren.

Gegenanzeigen

Utipro[®] plus darf nicht bei Patienten angewendet werden, bei denen eine Überempfindlichkeit gegen Xyloglucan, Gelatine oder einen anderen Bestandteil des Medizinprodukts bekannt ist.

Rev.02: 21.11.2016



NOVENTURE, S.L.
Calle Consejo de Ciento, 333, 08007 Barcelona - Spanien

Vertrieb: Pharmazeutische Fabrik Montavit Ges.m.b.H.
Salzbergstraße 96, 6067 Absam (Österreich)

CE 0373